

## **Порядок проведения МРТ**

1. Пациент приходит за 5-15 минут до назначенного времени (за 30 минут, если назначено исследование с внутривенным контрастированием), заполняет документы, предложенные ему администратором.
2. Администратор предлагает пройти пациенту в помещение для переодевания. Пациент снимает с себя всю одежду, кроме нижнего белья (женщины снимают бюстгалтер) и надевает одноразовую одежду.
3. Рентгенлаборант проводит визуальный контроль на наличие ферромагнитных предметов, проверяет пациента металлоискателем для обнаружения неснятых металлических предметов (часов, браслетов, цепочек и пр.). Пациент может закрыть кабинку для переодевания на ключ и передать его рентгенлаборанту на хранение. В помещение магнита заносить с собой ключ нельзя.
4. Рентгенлаборант укладывает пациента, устанавливает нужную катушку для исследования.
5. Рентгенлаборант разъясняет особенности исследования, длительность, аудиовизуальные и другие ощущения, отвечает на возникшие вопросы, обеспечивает пациента средствами защиты слуха, объясняет, как пользоваться системой подачи тревоги (пациенту в руки дают специальную грушу, нажатием которой он может попросить остановить исследование и подойти к нему), убеждается, что пациент понимает назначение системы.
6. Рентгенлаборант заводит пациента в тоннель томографа, убеждается, что пациент чувствует себя комфортно и после этого оставляет пациента одного.
7. Начинается сканирование. В процессе сканирования по согласованию с пациентом, и при наличии показаний ему может быть введен контрастирующий препарат.
8. В процессе сканирования рентгенлаборант поддерживает с пациентом связь через систему громкой связи.
9. По окончании сканирования рентгенлаборант выводит пациента из тоннеля, помогает ему подняться, провожает в кабинку для переодевания
10. Пациент одевает свою одежду, выходит из кабинки, направляется к стойке администратора для оплаты оказанных услуг (при оплате наличными).
11. Пациент может заказать компакт-диск либо пленку с записью своего исследования, а также заказать у администратора отправку медицинского заключения по электронной почте.
12. При наличии вопросов пациент может поговорить с врачом МРТ, проводившим исследование.

### **Примечания:**

1. При обследовании ребенка один из родителей может находиться с ребенком в помещении магнита. В этом случае система подачи тревоги находится в руках у родителя.
2. При проведении МР-холангиографии и МР-исследования брюшной полости необходим перерыв в приеме пищи/воды за 4 часа до исследования. Если вы принимаете гормонозаместительную терапию, проинформируйте об этом врача. МР-исследования органов малого таза у женщин желательно проводить в первую фазу цикла.
3. Просим Вас обратить внимание на то, что Ваш прием может быть задержан из-за необходимости экстренного исследования у предыдущего пациента или пациента Скорой помощи.